

# ข่าวเกษตรกาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทร : 03 456 4264

E - mail : Kanchanaburi@doae.go.th

สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค

## “เตือนภัยการเกษตร : โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic disease; CMD)”

โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic disease; CMD) มีแมลงหิวข้าวยาสูบ (tobacco whitefly) เป็นแมลงพาหะ โดยลักษณะอาการของโรคจะแสดงอาการ ใบด่างและใบหงิก เสียรูปทรง อาการต่างมีหลายแบบ เช่น ด่างเขียวขีดสลับเขียวเข้ม ด่างเหลืองสลับเขียว ใบหงิก หรือ หงิกเหลือง ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง ใบอ่อนและใบที่เจริญใหม่มีขนาดเล็กกลอง ยอดหงิก ลำต้นแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต ทำให้มันสำปะหลังไม่สร้างหัว หัวลีบเล็ก หรือหัวไม่มีแป้ง ส่งผลให้ผลผลิตลดลง หากเป็นโรคตั้งแต่ระยะต้นเล็กหรือติดมากับท่อนพันธุ์จะทำให้ผลผลิตเสียหาย 80 – 100 เปอร์เซ็นต์



ใบมันสำปะหลังปกติ



อาการด่างเหลือง



ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง

### แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

1. หมั่นสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ
2. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด จากแปลงที่ปลอดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
3. ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง
4. พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหิวข้าวยาสูบ ดังนี้

อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

ไทอะมิโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

5. หากพบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่างมันสำปะหลังให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านทันที

ข้อมูลภาพ : แผ่นพับเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง กรมวิชาการเกษตร



สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค  
เบอร์โทร. 034-591022

ฉบับที่ ๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข่าวเผยแพร่ โดย นางสาวปณัฏฐ์สรณ์ พันสุรินทร์