



DOAE NEWS

Kaset Kan

สำนักงานเกษตรอำเภอ

ไทรโยค



ฉบับที่: 10

ภาพ/ข่าว: ปณิฏฐ์สรณ์ พันสุรินทร์

วันที่ 11 กันยายน 2566

เฟื้อะวัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

สาเหตุจากเชื้อไวรัส *Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)*

▶ อาการของมันสำปะหลังที่เป็นโรค :



ยอดแตกใหม่
แสดงอาการ
ต่างเหลือง

▶ การถ่ายทอดโรค :



แมลงหริวขาวยาสูบ



ท่อนพันธุ์

ใบด่างเหลือง
เสียรูปทรง/ลดรูป

แมลงหริวขาวยาสูบพาหะนำโรค

▶ พืชอาศัยของแมลงพาหะ :

มันสำปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา
โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ
พืชตระกูลถั่ว และวัชพืชที่ติดมา
กับพืชอาศัย

▶ แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด :

- ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์จากต่างประเทศ
- ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค
- หมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- กำจัดแมลงพาหะนำโรคใบด่าง ได้แก่ แมลงหริวขาวยาสูบ
- หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของเชื้อไวรัส และพืชอาศัยของแมลงพาหะ บริเวณแปลงมันสำปะหลัง
- หากพบมันสำปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่าง แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ไกลบ้านหรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ทันที

▶ พืชอาศัยของเชื้อไวรัส :

มันสำปะหลัง สมูตำ ละหุ่งและ
พืชตระกูลถั่วต่างๆ



ลำต้นแคระแกร็น



พาลิดเสียหาย 80-100 %



ส่วนงานข้อมูลพื้นฐาน : กลุ่มพยากรณ์และแจ้งการระบาดของโรคพืช / กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย , กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 2935 1626
พื้นที่ / โทร : กรมวิชาการเกษตร / สถาบันวิจัยพืชสวนกำแพงเพชร

